



DONES SENSE TABAC



CÁNCERES ESPECÍFICOS EN LA MUJER

Las fumadoras presentan un doble riesgo relativo a desarrollar un cáncer de cérvix.



PROBLEMAS EN LA MENSTRUACIÓN

En fumadoras, la regla es más irregular y es más frecuente la presencia de dismenorrea. La menopausia se adelanta de 2 a 3 años, lo que agrava el riesgo de osteoporosis.



OSTEOPORÓISIS Y DENSIDAD ÓSEA

Las mujeres fumadoras presentan más problemas de osteoporosis y, en consecuencia un mayor porcentaje de fracturas, lo cual afecta notablemente a la calidad de vida y al grado de invalidez, que es mayor en las fumadoras.



SISTEMA CARDIO-VASCULAR

El daño que provoca el tabaco es todavía mayor en la mujer después de la menopausia, ya que disminuye el efecto cardioprotector que le proporcionaban los estrógenos. Las mujeres que toman anticonceptivos orales y fuman tienen un mayor riesgo de trombosis y embolias (20 veces más), ya que aumenta la viscosidad y agregación plaquetaria.

PROBLEMAS DE REPRODUCCIÓN Y EN EL FETO

Aumenta la infertilidad, por sufrir las fumadoras más infecciones en los órganos reproductores; la concepción se retrasa de media unos pocos meses.

Existe un mayor riesgo de embarazo ectópico, de aborto y de parto pretérmino.

También existe un mayor riesgo de placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta y un descenso del peso placentario.

El peso del recién nacido se reduce entre 150-200g.

El hecho de que la madre fume durante el embarazo aumenta un 50% de probabilidades de que el niño desarrolle la muerte súbita del lactante.



AYUNTAMENT DE
Paterna

REGIDORIA DE PROTECCIÓ
A LES PERSONES
DEPARTAMENT DE SANITAT



Unitat de Prevenció Comunitaria
en Conductes Adictives



GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL
I SALUT PÚBLICA